



**গ্রামীণ কৃষি মৌসম সেবা  
ভারত আবহাওয়াবিজ্ঞান বিভাগ  
জেলা স্তরের অ্যাগ্রোমেট উপদেষ্টা বুলেটিন  
(বিসিকেভি এবংআই এম ডির পক্ষ থেকে যোথ আমন্ত্রণ)  
কৃষি আবহাওয়া উপদেষ্টা বুলেটিন**

তারিখ : ১৯-০৪-২০২৪

**২৪-প্ৰাগনা-উত্তৰ (পশ্চিম বঙ্গ) জেলা ভিত্তিক , আবহাওয়াৰ পূৰ্বাভাস -**

**প্ৰকাশনাৰ তাৰিখ : ২০২৪-০৪-১৯**

**( পৰেৰ ৫ দিন সকাল ০৮:৩০ পৰ্যন্ত বৈধ)**

**আবহাওয়াৰ পূৰ্বাভাস**

- \*আগামী কয়েকদিন বৃষ্টিহীন থাকাৰ সন্ধাবনা আছে।
- \* আগামী কয়েকদিন আকাশ পৱিষ্ঠাৰ থেকে আংশিক মেঘলা থাকাৰ সন্ধাবনা রয়েছে।
- \* আপেক্ষিক আৰ্দ্ধতা সৰ্বাধিক 53 % to 82% থাকাৰ সন্ধাবনা রয়েছে।
- \* সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা 36.0-38.0 ডিগ্ৰি সেলসিয়াসেৰ আশে পাশে থাকবে।
- \* সৰ্বনিম্ন তাপমাত্ৰা 26.0-27.0 ডিগ্ৰি সেলসিয়াসেৰ আশে পাশে থাকবে বলে আশা কৱা হচ্ছে।

**সাধাৱণ প্ৰামৰ্শ**

সমস্ত কাজ সকাল ১১ টাৱ আগে ও বিকেল ৪ টাৱ পৰে কৱন।

কাজ কৱাৰ সময় সাদা পোশাক আৱ সাদা টুপি পৱিধান কৱন।

বোৱো ধানে নিৰ্দিষ্ট মাত্ৰাৰ জলেৱ লেভেল বজায় ৱাখুন।

সবজি ক্ষেত্ৰে জলসেচ কৱন।

নিয়মিত ডাবেৱ জল ও লেবুজল পান কৱন।

**এস. এম. এস.**

তাপপ্ৰবাহ থেকে বাঁচতে নিয়মিত ডাবেৱ জল ও লেবুজল পান কৱন।

## আবহাওয়া ভিত্তিক কৃষি পরামর্শ

### বোরো ধান

---

পাশকার্থি দশা / পুস্পমঞ্জরী বিন্যাস পর্যায় : যারা চারা তৈরি করে মূল জমিতে রোয়া করে দিয়েছেন তাদের এখন সুসংহত উপায়ে আগাছা নিয়ন্ত্রণ, রোগপোকা দমন, সঠিক সময়ে ও মাত্রায় সার প্রয়োগের বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে। রোয়ার ১৫ দিন পর (চারার বয়স ৩ সপ্তাহ) প্রথম চাপান ও চারার বয়স ৬ সপ্তাহ হলে দ্বিতীয় চাপান দেবেন। মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে অনুধাদ্য দিলে ফলাফল ভালো হতে পারে। জিঙ্ক অনুধাদ্যের অভাব মেটাতে একর প্রতি ১০ কেজি জিঙ্ক সালফেট মূল সার বা প্রথম চাপানের সাথে দিতে হবে অথবা রোয়ার ১ মাস ও ১.৫ মাস পর প্রতি লিটার জলে .৫ গ্রাম চিলেটেড জিঙ্ক গুলে স্প্রে করা যায়। বোরন অনুধাদ্যের অভাব হলে ১-২ কেজি বোরক্স প্রতি হেক্টের জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। চারা রোয়ার পর থেকে ধান কাটার ১০-১৫ দিন আগে পর্যন্ত ২.৫ সেমি জল ধরে রাখুন। আগাছা দমনের জন্য রোয়ার ৩-৪ দিন বাদে প্রেটিলাক্রোর স্প্রে করতে হবে। রোয়ার ১০ দিন ও ২০ দিন বাদে আগাছা দমন করুন।

---

### পাট

বপন ; পাট চাষের জন্য উল্লিখিত বীজ এখন থেকে সংগ্রহ করুন। জমির মাটি খুব ঝুরঝুরে তৈরি করা দরকার। জমি তৈরির সময়ে ২ কেজি অ্যাজোটোব্যাকটর ও পি. এস. বি. মিশ্রণ ১০ কুইন্টাল প্রতি একর জৈব সারের সাথে মিশিয়ে প্রয়োগ করুন। বীজের হার তিতা পাটের জন্য সারিতে বুনলে ২.৪ কেজি ও মির্ঠা পাট ১.৬ কেজি বীজ লাগে। বীজ বোনার যন্ত্রে বুনলে ২ কেজি তিতা পাটের ও ১.৫ কেজি মির্ঠা পাটের বীজ লাগে। বীজ বোনার দূরত্ব তিতা পাটের জন্য ২৫ সেমি X ৫ সেমি ও মির্ঠা পাটের জন্য ২০ সেমি X ৫ সেমি রাখুন।

.....

### মুরগী

ডিম পাড়া মুরগী এবং মাংসের জন্য মুরগী

## উচ্চ তাপমাত্রার প্রভাব

- পানীয় জলের পাত্রের সঙ্খা বাঢ়াতে হবে।
- পানীয় জলে ইলেক্ট্রলাইট মিশিয়ে পান করাতে হবে।

## গবাদী পশু

বাচুর এবং পূর্ণবয়স্ক গরু

## উচ্চ তাপমাত্রার প্রভাব

- দুপুরে মাঠে গবাদী পশু মাঠে ছেড়ে রাখা যাবে না।
- পুরুরের জলের বদলে টিউবয়েলের জল পান করাতে হবে।